

Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question marquer la case correspondant à la réponse correcte sans faire de ratures. Il n'y a qu'une seule réponse correcte par question.

Question 1 : Soit l'équation différentielle

$$y' \sin(x) + y \cos(x) + \sin(2x) = 0$$

pour $x \in]0, \pi[$. Alors la solution générale est

$y(x) = e^{-\text{Log}(\sin(x))} \cos(2x) + \frac{C}{\sin(x)}$ avec $C \in \mathbb{R}$

$y(x) = \frac{\sin^2(x) + C}{\cos(x)}$ avec $C \in \mathbb{R}$

$y(x) = \frac{\cos^2(x) + C}{\sin(x)}$ avec $C \in \mathbb{R}$

$y(x) = \frac{\sin^2(x) + C}{\sin(x)}$ avec $C \in \mathbb{R}$

Question 2 : Soit l'équation différentielle

$$xy' - y = x \cos^2\left(\frac{y}{x}\right)$$

pour $x \in]0, \infty[$ avec $y(1) = \frac{\pi}{4}$. Alors

$y(x) = x \text{Arctg}(\text{Log}(x) + 1)$

$y(x) = x \text{Arctg}(\text{Log}(x)^2 + 1)$

$y(x) = \frac{1}{x} \text{Arctg}(\text{Log}(x) + 1)$

$y(x) = x \text{Arctg}\left(\frac{1}{x^2}\right)$

Indication: Effectuer le changement de variables $y(x) = xv(x)$.

Question 3 : Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{y \text{Log}\left(1 + (x^2 + y^2)^2\right)}{(x^2 + y^2)^{5/2} \exp\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)}$$

pour $(x, y) \neq (0, 0)$. Alors

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{1}{4}$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1$

Question 4 : Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^5 - y^5}{x^4 + y^4} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Alors

$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = -1$

$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 1$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -1$

Question 5 : Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x,y) = \frac{y}{x} + (1 - \cos(y)) \sin^2(x)$$

et soit le point $\vec{p} = (\frac{\pi}{2}, \pi)$. Le plan tangent au graphe de f en $(\vec{p}, f(\vec{p}))$ est donné par l'équation

$z = -\frac{4}{\pi}(x - \frac{\pi}{2}) + \frac{2}{\pi}(y - \pi)$

$z = \frac{2}{\pi}y - \frac{4}{\pi}x + 4$

$z = \frac{2}{\pi}y + \frac{4}{\pi}x + 4$

$z = -\frac{4}{\pi}x + \frac{2}{\pi}y$

Question 6 : Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x,y) = \text{Log}(x^2 + y) \cos\left(\frac{\pi}{x^2}\right)$$

pour $x > 0$ et $y > 0$. Alors la dérivée directionnelle de f au point $(1,1)$ dans la direction $\vec{e} = (0,1)$ est égale à

$\frac{1}{2}$

2

$-\frac{1}{2}$

π

Question 7 : Soit $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 1, y \geq 1, x+y \leq 3\}$. Alors

$\int_D f(x,y) dx dy = \int_1^2 \left(\int_1^{2-y} f(x,y) dx \right) dy$

$\int_D f(x,y) dx dy = \int_1^2 \left(\int_1^{3-x} f(x,y) dy \right) dx$

$\int_D f(x,y) dx dy = \int_1^{3-x} \left(\int_1^2 f(x,y) dx \right) dy$

$\int_D f(x,y) dx dy = \int_1^3 \left(\int_1^{3-x} f(x,y) dy \right) dx$

Question 8 : Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = x + x^2 e^{\sin(y)}.$$

Alors la matrice hessienne de f est

- $\begin{pmatrix} 2e^{\sin(y)} & 2x \cos(y) e^{\sin(y)} \\ 2x \cos(y) e^{\sin(y)} & x^2 (\cos(y)^2 - \sin(y)) e^{\sin(y)} \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} x^2 (\cos(y)^2 - \sin(y)) e^{\sin(y)} & 2x \cos(y) e^{\sin(y)} \\ 2x \cos(y) e^{\sin(y)} & 2e^{\sin(y)} \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 2e^{\sin(y)} & 2x \cos(y) e^{\sin(y)} \\ 2x \cos(y) e^{\sin(y)} & x^2 \cos(y)^2 e^{\sin(y)} \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 2e^{\sin(y)} & 2x \cos(y) e^{\sin(y)} \\ 2x \cos(y) e^{\sin(y)} & -x^2 \sin(y) e^{\sin(y)} \end{pmatrix}$

Question 9 : Soit la fonction $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y, z) = 2z^3 - 3yx^3 - 6yz$$

et la fonction $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie implicitement par l'équation

$$f(x, y, g(x, y)) = 11.$$

Sachant que $g(1, 3) = -2$, on a

- $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 3) = \frac{12}{5}$
- $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 3) = 0$
- $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 3) = 11$
- $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 3) = \frac{9}{2}$

Question 10 : Soit $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction quelconque de classe C^1 .
 $(x, y, z) \mapsto g(x, y, z)$

On considère la fonction

$$h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) \mapsto h(u, v) = (ve^{-2u}, u^2 e^{-v}, u)$$

et on définit $f = g \circ h$. Alors

- $\frac{\partial f}{\partial u}(1, 0) = 2 \frac{\partial g}{\partial y}(1, 0, 1) + \frac{\partial g}{\partial z}(1, 0, 1)$
- $\frac{\partial f}{\partial u}(1, 0) = \frac{\partial g}{\partial x}(0, 1, 1) + 2 \frac{\partial g}{\partial y}(0, 1, 1)$
- $\frac{\partial f}{\partial u}(1, 0) = 2 \frac{\partial g}{\partial x}(0, 1, 1) + \frac{\partial g}{\partial z}(0, 1, 1)$
- $\frac{\partial f}{\partial u}(1, 0) = 2 \frac{\partial g}{\partial y}(0, 1, 1) + \frac{\partial g}{\partial z}(0, 1, 1)$

Question 11 : Soit l'équation différentielle

$$y'(y + x^2y) = x$$

pour $x \in \mathbb{R}$ avec $y(0) = 2$. Alors la solution $y(x)$ vérifie

$y(1) = \sqrt{4 + 2 \operatorname{Log}(2)}$.

$y(1) = 2 + \sqrt{\operatorname{Log}(2)}$.

$y(1) = \sqrt{4 + \operatorname{Log}(2)}$.

$y(1) = -\sqrt{4 + \operatorname{Log}(2)}$.

Deuxième partie, questions du type Vrai ou Faux

Pour chaque question, marquer (sans faire de ratures) la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire, si elle est parfois fausse).

Question 12 : Soient h et k deux fonctions continues définies sur \mathbb{R} avec $h(0) \neq 0$. S'il existe un nombre réel α tel que $k(x) = \alpha h(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors l'équation différentielle $y' + h(x)y = k(x)$ est séparable.

VRAI FAUX

Question 13 : Si $y(x)$ est la solution générale d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, alors pour toute constante $C \in \mathbb{R}$ la fonction $y_1(x) = y(x) + C$ est aussi solution de l'équation.

VRAI FAUX

Question 14 : Si $y_1(x)$ et $y_2(x)$ sont deux solutions d'une équation différentielle linéaire du deuxième ordre à coefficients constants, alors $y(x) = 2(y_1(x) - y_2(x))$ est solution de l'équation homogène associée.

VRAI FAUX

Question 15 : Soit une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(0,0) = 0$. Si pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ on a

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(\alpha t, \beta t) = 0,$$

alors f est continue en $(0,0)$.

VRAI FAUX

Question 16 : Si une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^2 , alors pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

VRAI FAUX

Question 17 : Soit une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Si f est différentiable en (x, y) , alors

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x+h, y+k) - f(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)h - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

VRAI FAUX

Question 18 : Soient $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux fonctions de classe C^1 . Soit $h = f \circ g$ et $\vec{p} \in \mathbb{R}^n$. Alors

$$J_h(\vec{p}) = J_g(f(\vec{p})) J_f(\vec{p}).$$

VRAI FAUX

Question 19 : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 . Alors pour tout $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ on a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h^2, y_0) - f(x_0, y_0)}{h^2}.$$

VRAI FAUX

Question 20 : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un ensemble borné et fermé $D \subset \mathbb{R}^2$ et soit $\tilde{D} \subset \mathbb{R}^2$ un ensemble borné et fermé. Si $G : \tilde{D} \rightarrow D$ est une fonction bijective de classe C^1 alors on a :

$$\int_D f(x, y) dx dy = \int_{\tilde{D}} f(G(u, v)) |\det(J_G(u, v))| du dv$$

VRAI FAUX

Question 21 : Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et soit $\vec{p} \in \mathbb{R}^n$. Si f admet un extremum local en \vec{p} , alors \vec{p} est un point stationnaire de f .

VRAI FAUX

Question 22 : Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et soient $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe C^1 . Alors la fonction

$$F(t) = \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx$$

est de classe C^1 et on a

$$F'(t) = f(b(t), t) b'(t) - f(a(t), t) a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} (\partial_2 f)(x, t) dx.$$

VRAI FAUX